

7. bre
1780

no 107.

Annales.

VI

no 96.

Dissertation Sur la nécessité de faire promptement
l'opération de la hernie avec étranglement par
inflammation

Les accidens de la hernie étranglée sont si rapides et si peu ordonnés, que le plus exact observateur ne peut pas se flatter d'en déterminer les époques.

Il n'est donc pas étonnant que je propose un moyen actif et urgent qu'on emploie trop rarement. je veux parler de la nécessité urgente de l'opération de la hernie étranglée par inflammation ou par spasme.

Le progrès de cette maladie ne se fait pas toujours aussi rapidement chez tous ceux qui en sont atteints. les vieillards sont ceux chez qui la nature fait quelques fois des exceptions. M. Garennot rapporte dans ses observations sur les hernies avec étranglement, tom. I. p. 290. ed. 3. em. qu'une femme

agée de 73. ans fut atteinte de cette maladie, et abandonnée de son chirurgien, qui l'avait condamnée, il fut appelé pour voir cette malade, et lui fit l'opération le 11. jour de la maladie, et elle guerrit en quatre semaines.

Dans le courant de 7. bre 1789. je fut mandé à l'aveau battage de Dole auprès de M^{lle} Dangey âgée 70. ans, qui avoit une hernie inguinale grosse comme une noix, qu'elle portoit depuis longtemps sans incommodité. lorsqu'elle fut atteinte d'étranglement dans cette partie avec tous les accidens qui en sont les suites. après le traitement ordinaire, les accidens augmentèrent. je fis appeler M. Lombard maître en chirurgie adole pour voir la malade avec moy. il fit continuer les mêmes soins, et le sixième jour depuis l'instant de l'étranglement je parvins à réduire la tumeur par le taxis, et elle fut guerrie.

après ces faits, les antagonistes de la bonne chirurgie s'opposeroient hautement à une opération aussi nécessaire dans les cas d'étranglement par inflammation que la vie est précieuse. leur raison prévaudroit. Mais si l'on veut abandonner à la nature une maladie qui ne se guerrit



ARCIS

d 93

no 1

que par l'opération, Lors qu'elle est faite à tems, & qui
dans des cas de ses peries, produit les plus grands avantages
garenget cite à cette occasion tom I. p. 280. 003.

XIV une preuve certaine. M. Dionis commente par
M. de la faye dans son cours d'opération ed. IV —
p. 363. dit que M. de la pyronie fit cette opération —
— a un homme âgé de 63 ans, qu'il fut obligé de lui en porter
— de 7 pouces de longueur du canal intestinal, le huitième jour de la
— maladie, & qu'il guerrit, M. de la pyronie a fait plusieurs fois
cette opération avec succès.

mais il ne faut pas toujours attendre tous les accidens qui accompagnent
ordinairement cette maladie, & qui caractérisent la gangrène,
l'affaiblissement du ventre, la diminution des forces, la petitesse, &
l'irrégularité du pouls, les vomissemens de matières stercorales,
pour procéder à l'opération, il y a des personnes qui meurent
dans les 24 heures sans avoir eu ces accidens graves ni des
signes certains de gangrène.

je eû occasion de voir M^{lle}. de chanoinesse a . . .
agée de 66. ans qui mourut dans l'espace de 30 heures d'une
hernie crurale au mois de jbre 1797, qu'elle portoit
depuis longtemps sans incommodité, lors qu'elle fut tout à coup
surprise, par des douleurs violentes à l'estomac, & dans
l'endroit de la tumeur après des éclats de rire excessifs,
malgré les ressources de l'art, les douleurs persistèrent, &
sans autres accidens elle périt le lendemain après midi.
à l'ouverture du cadavre, le sac herniaire pesoit 31 onces, &
le trou ombilical par le qu'il étoit passé la portion de l'intestin
colon qui avoit 18. pouces de longueur étranglée sans adhérence
étoit large comme un clou de trois lignes, une grande partie
de l'épiploon y étoit aussi. l'un, & l'autre étoient gangrenés.
l'opération faite 24 heures plutôt auroit sans doute sauvé
la malade, n'ayant point de complication.

3
un jeune homme âgé de 26 ans laboureur à
Charvry, fort et robuste, portoit depuis quelques années
une hernie d'aine droite sans gêne, et sous la décharge,
après des épreuves de forces, je le vit dans les accès
l'ane hernie étranglée après fut heures. le lendemain
les trachotements arrivèrent, après les secours
pour les malades inutilement employés, j'eus l'air
sur la nécessité de l'opération comme dernière ressource,
mais l'opinion contraire de deux autres coupures
prévalut et le malade perit victime de la pluralité des
suffrages. Il y avoit à peine 36 heures que
l'étranglement s'étoit fait, je fis l'ouverture de la
tumeur, et trouvois l'intestin gangrené, cette mort que
j'avois prévue ne me surprit pas, en me persuadant que
l'on ne pouvoit pas opérer trop tôt, et qu'il ne falloit pas
attendre de la nature chez les jeunes gens, les mêmes
ressources qu'on croit devoir attendre chez les vieillards.

Il suffit d'avoir employé tous les remèdes
nécessaires; et cette maladie pendant quelques heures
sans succès, pour procéder à l'opération, surtout
si aux accès de la première apparition se joignent,
le hoquet, les défaillances, le froid des extrémités, les
sueurs sur la face.

malgré toutes les saignées, et l'application des
autres remèdes l'on voit toujours mourir les malades
de gangrène dans la partie, si l'opération n'est pas
faite assez tôt, comme le remarque M. Haister. p.
359. art. XI. chap. des hernies. mais mise en
pratique souvent en retard, on a été obligée de
retrancher une portion d'intestin gangrené, on



peut joindre à l'exemple cité de M. de la Peyronie à cette occasion, celui de M. de vanderkro, celui de M. Mery qui fut obligé d'enlever de cinq pieds d'intestin gangrené, celui de M. Ledran qui n'aurait pas trouvé l'intestin gangrené s'il en moins tardé son opération, et celui de M. de la Motte qui n'aurait pas abandonné son malade, en 1707 a qui il trouva l'intestin gangrené, et qui mourut le lendemain.

la nature dans ces cas d'étranglement veut donc être aidée, par le chirurgien, qui aura tout mis en usage, et les légers tentatives pour réduire la hernie par le taxis, ainsi que les autres moyens sans succès. Il ne reste plus qu'une ressource, c'est l'opération, il faut la mettre en pratique d'abord que les premiers remèdes n'opèrent pas la réduction. cette maladie est une de celles qui sont dans la classe des très aigues. or dans les maladies extrêmes, les remèdes extrêmes, suivant Hippocrate, et après lui Celse.

de la faire tot ou tardive plusieurs avantages. 1^o l'intestin ne se trouve pas gangrené comme on le voit presque toutes les fois qu'on a trop retardé l'opération. 2^o dans ce cas on évite la suppuration, et l'évolution d'un ou de plusieurs de la tuniques comme l'a remarqué M. AVNARD après l'opération qu'il fit de la hernie avec étranglement, à un malade qui vendit une portion d'intestin avec les excréments et qui guérit, 3^o il n'a pas encore eu le temps de se contracter adhérence avec les parties qui l'étranglent, ce qui fera que l'opération en sera moins longue, moins douloureuse, et le malade sera

6
aura moins de dangers à le voir pour les parties,
et le chirurgien moins de crainte d'ouvrir l'intestin
40. au p. 298. L'intestin s'effle ne se voit rien on
sait que M. Heister les a impunément coupés
longitudinalement à un chien. & Amalho
transversalement, à une femme de la Cour
de Bruns vic. 50 de deux douleurs qui se font dans
un corps animal, la plus forte observe la plus
faible. or il est certain que les douleurs de l'opération
soient plus vives que les douleurs de la hernie, si celles
de l'opération sont égales à celles de la douleur herni-
aire; vous n'aggravez pas l'état du malade; si elles
sont moindres, vous soulagez & vous savez en
diminuant ces douleurs: quand elles seroient plus
fortes vous aggravez l'opération. Or quand même il
arriveroit que la hernie dut ventrer au quart d'heure
après l'opération faite, chose que l'on ne fait
jamais, c'est toujours au quart d'heure de douleurs
extrême éprouvée au malade. M. Garennot adit
- tom I. p. 298. j'ai observé dit-il que l'étranglement
- de l'intestin qui arrive aux vieilles gens n'est jamais
- affecté pour le gangrener, ni attirer trop d'inflammation
- ce qui est un très grand avantage, & qui doit engager
- le chirurgien à faire l'opération quand même
- les autres en paroissent de se passer.

cette remarque bien d'être contraire à mon opinion
la prouve d'autant plus que le peu de succès que l'on
promet M. Garennot vient du retard de l'opération
de l'opération. au sur plus quand même l'opération

6.

seroit incertain si vaut mieux employer un remède incertain que d'abandonner son malade à une mort inévitable. Selon M. Heister. p. 369. et les principes de chirurgie de M. de LaFaye p. 150.

1^o enfin il n'en restera au plus qu'une plaie simple dans la peau, et la graisse qui sera bientôt cicatrisée, par des pensements simples, et méthodiques, pour être guéri radicalement de son hémie.

L'opération est donc nécessaire bien plus, j'ose dire indispensable, sans pouvoir limiter le temps. L'expérience apprenant qu'il ne faut que peu d'heures pour la formation de la gangrène.

On auroit donc d'un avantage de faire l'opération de bonne heure; le malade ne seroit pas exposé à de pressants dangers, et l'opérateur auroit moins de difficultés à lever, pour arriver à son but, à la guérison. n'est il pas plus aisé par exemple, après avoir découvert l'intestin et les autres parties étranglées de les réduire, lorsqu'il ny a point adhérence, au lieu d'admettre la méthode de M. LeBlanc, ne seroit il pas mieux dans cette opération de sillonner d'un coup de bistouri la circonférence de l'anneau, après avoir fait l'ouverture cutanée beaucoup plus grande qu'il ne faut, n'auroit on pas lieu d'attendre que les bords se rapprochoient et se colloient d'une façon à contenir plus solidement l'intestin dans son local. M. Heister p. 312. art du bubonocèle avec étranglement. M. Leclerc

7

recommande dans la chirurgie complète Chp.
XIII. p. 290. de Scarifier l'anneau pour faire
une bonne cicatrice.

Par ces considérations, Par ces raisons, et par
ces autorités. on demande à M. M. si une
opérateur, n'est pas fondé à manœuvrer méthodiquement avec le fer des qu'il a employé
les premiers moments à réduire inutilement
une hernie étranglée. cette opération paroit
d'autant moins redoutable, c'est qu'elle se fait par
des instruments bien tranchants, et que s'il y a eu
quelques dangers ou mauvaise suites après cette
opération cela ne put arriver que de quelques
portion gangrenée qui ou se heurte à la vue de
l'opérateur, soit que la gangrène ait été au dedans de la
cavité de l'intestin, soit au dessus, soit au dessous de
l'étranglement, ou si l'opérateur ne pas
enlever toutes les parties gangrenées, ou qu'il en
touché une partie saine avec la surface de l'instrument
qui a eu un contact avec les parties gangrenées, alors
il aura inoculé le virus gangreneux à la partie
saine, et se fera la cause du peu de succès de
l'opération, car il est connu de tous les maîtres en
chirurgie qu'on enlève impunément une portion
longitudinale quelconque de l'intestin.

à charger par respect
en f. conti

Vermillet maître
en chirurgie



III X

1845

Elle étoit d'un âge de 42 ans portoit depuis
dix ans au pty de l'aîne du côté droit ala suite d'une bouche laborieuse
une petite hernie inguinale grosse comme une olive. elle ne lui avoit
jamais fait mal, quoy qu'elle vaquât sans cesse aux ouvrages pénibles
d'un menage considérable. Le 17 de mai de mai 1779 elle fut
purgée avec une medecine qui lui procura quinze selles dans la
matinée, et ensuite un vomissement considérable d'eau. L'evacuation
par les selles, fut terminée a cet événement. La malade dina peu
et sur les six heures du soir, elle se sentit de violentes douleurs de
Colique a l'estomac, dans le ventre et qui se faisoient fortement
ressentir a l'endroit de la petite hernie, qui augmenentoit en grosseur
a mesure que les douleurs devenoient plus vive, elle y détermina la
malade a envoyer chercher son chirurgien qui arrivoit a dix
heures du soir. Il se fit rendre compte de ce qui s'étoit passé dans
la journée, la malade lui fit aussi l'aveu de la hernie qu'elle portoit
depuis long temps et de son augmentation.

Il reconnut l'état critique de la malade. et lui administra les
remèdes dont on se sert en pareille cas. les vives douleurs et les
accidents devenoient plus fréquents et plus graves. D'un moment a l'autre
malgré tous les secours que son chirurgien avoit portés, les accidents
augmenentoient. le poul devenoit plus foible, les envies de vomir étoient
plus fréquentes, la malade éprouvoit des poi bles, des meaux coeurs, les
même douleurs au ventre, a l'aîne, et a l'estomac, les lueurs au visage,
le froid des extrémités, tant supérieures qu'inférieures, les lavemens
emollients donnés d'heure en heure, étoient vuidés sans tout apaiser
sans aucunes marques de matieres, enfin tout annonçoit l'orage
qui devoit bientôt eclater, et ne laissoit d'esperance que dans
l'operation.

La nuit du 17 le jour et la nuit du 18 se passerent dans ces
horreurs de meaux et de douleurs, lors que je fus mandé le 19 a
midy. j'allai avec mon ami le docteur de la faculté de
l'operation. On mit auparavant en usage les bains que la



malade souffrait très bien pendant les paux. Les hoers ordinaire
les douleurs pendant ce temps, se calmaient, mais ce n'est qu'un feu
mal étouffé, tous les accidents se dessuss se ranimèrent avec plus de
violence, le hoquet les vomissements des matières foetides se
jouaient avec tous les autres accidents, & augmentèrent de plus
en plus l'état dangereux de la maladie. tout offroit la nécessité
d'opérer.

Le 20 que j'y procédai dans la matinée, de la manière
suivante, en présence d'un médecin et d'un chirurgien ordinaire
de la maladie. après l'avoir étendue de la manière convenable,
dresé la peau et la graisse, je l'inçai avec un bistouri courbe,
jusqu'à ce qu'il m'eût paru que je dissequai, & parvins par ce
moyen à l'intestin sorti et étranglé d'une coulure d'oune. Il
me restoit plus que la dilatation de l'anneau pour faire
ventre cette portion de boyau, mais je fut trompé dans
mon espoir. je croyois dilater l'anneau & réduire
la hernie, mais elle étoit adhérente dans toute sa circonférence
avec l'anneau, et m'obligeoit à une dissection d'autant plus
douloureuse qu'elle fut plus longue. La petite hernie que
portoit le malade depuis dix ans étoit une petite poche
en forme d'appendice comme seroit celle de l'intestin caecum,
qui se trouvoit bien distincte de la portion du boyau étranglé,
cette poche n'étoit dans son principe qu'un pincement d'une
partie de l'intestin étranglé. après quinze minutes de
travail, & après m'être bien assuré que l'intestin n'étoit
plus adhérent à nul part de l'anneau, je parvins à mon but,
à la réduction de la hernie.

L'appareil fut appliqué de la façon suivante. je
portai dans le fond de la plaie une tante môle et l'autre
l'autre tante de charpie brute, & une pelotte en fût de

Des deux pressés gradués, le tout contenu avec un bandage en spica de l'aine. les vomissements des matières fétides, le hoquet et les autres fâcheux accidents ne cessèrent de la journée. le pouls qui prit de la force dans l'après midi, nous engagea à pratiquer une saignée du bras, qui mit du calme en son lieu. deux heures après, fut gardée un peu. d'intermittence entraîna par la sortie des matières. il fut repeté le lendemain matin. les accidents diminuèrent enfin sur le soir du même jour on donna un autre lavement qui procura une évacuation abondante de matières stercorées. le repas et la cessation de presque tous les accidents.

Les évacuations périodiques parurent le vingt deux, les matières qu'on évacua furent encore éloigné du terme, à cette époque les accidents qui restoient encoir cessèrent entièrement.

L'appareil ne fut levé que le vingt trois, la suppuration étoit établie ce qui lui procura la fièvre pendant quarante huit heures, la plaie étoit belle rouge, et le pus d'une belle qualité, elle fut pansée avec une tante liè et chargée d'un onguent fait avec partie de baume d'arcanes de baillieum et d'huile d'hypericum. le malade à son cinquième jours de suppuration n'avoit éprouvé aucun accident, la fièvre de suppuration étoit passée, la plaie continuoit d'être rouge, les chairs grenées et vermeilles le pus étoit blanc, épais, et gluant, de bonne odeur et d'une médiocre quantité, je touchois à l'instant de la laisser cicatriser en supprimant les tantes liè, et l'onguent, lors que le lendemain (c'étoit le sixième jours des pansements) je trouvai l'appareil humide comme si on l'avoit arrosé, les tantes et le phlegme étoient imprégnés d'une matière jaune et safranée qui étoit fort abondante, et qui avoit tint les linges

1

de la malade de la Colonne, il lui survint au même moment
des hémorroides considérables qui lui faisoient beaucoup de
douleurs, elle fut atteinte pendant la nuit qu'elle passait sans dormir
ce qui ne lui étoit pas encore arrivé de puis le lendemain de
l'opération. la fièvre survint, elle étoit dans un état de battement
et d'inquiétude. ma surprise fut grande de trouver dans l'espace
d'une nuit un changement si considérable en mal, au quel je ne
devois pas m'attendre. je pensai ma malade comme d'ordinaire
en ajoutant une compresse en plusieurs double au dessous du
ply de laine pour retenir l'humeur qui sortoit par la
plaie. je fut étonnée de cette apparence plaignement
convient de l'ouverture de l'intestin, par la pression légère
que je fit du côté du ventre au dessus de la plaie, il en sortit
une humeur aqueuse de couleur rouge qui n'avoit pas enco-
ré parue à aucuns pansements. après avoir examiné la
compresse qui avoit retenu les matières jaunes sortant de
l'intestin, je les reconnus à leur odeur et à leur couleur
pour matières stercorales. cet écoulement assez considéra-
ble n'empêchoit pas que la malade n'ait la selle tous les jours
même plus d'une fois et qu'elle n'y fit des matières qui avoient
de la consistance.

les hémorroides la fièvre et les autres accidents durèrent
plusieurs jours, mais les hémorroides furent diminués avec
un liniment de beurre frais, répété plusieurs fois le jour, après
quoy elles ont flui. les douleurs et la fièvre se sont passés. la
plaie a été pansée avec un morceau de pouce préparé et garnie
de charpie de li que je portoit perpendiculairement dans le fond
de la plaie. J'ai paroissoit sortir la matière que j'avois remouée
et par dessus de chaque côté je mettois l'autre tante de charpie

pour entretenir les bords de la plaie ouverte et m'opposer
à leur réunion qui se faisoit contre mon intention, je pansoit
deux fois le jour, par cette méthode j'ai fait parvenir à ma
satisfaction à tenir la plaie suffisamment ouverte à porter
obstacle à la sortie de l'humeur stercorale et à lui faire suivre
le canal intestinal. la malade prenoit aussi deux fois le jour
un bol fait avec douze grains de kinkina pulvérisé mêlé avec
de la theurebentine laëie et de la conserve de rose de chaque douze
grains. elle n'étoit alimentée qu'avec de la crême de pain-
tres claire et passée aux tamis, des gruaux, et un bouillon
gras amidié dans le quel on faisoit cuire quelque peu de
vit. La boisson étoit de l'eau de vit par ces moyens j'ai
parvenu à réunir l'intestin et à rendre la plaie en très-bonne
rouge et les chairs de belle qualité. le pus diminué de
quantité a repris cette couleur blanche épaisse et gluante et
a déterminé à supprimer la tante d'éponge préparé avec une
partie des autres lantes pour laisser terminer la maladie
en procurant une bonne cicatrise.

elle étoit à son vintième jour de pansements, depuis
l'opération et au huitième depuis la suppression des lantes
et de l'éponge préparé, les bords de la plaie se rapprochoient
je jouissois déjà du plaisir de terminer heureusement une
maladie aussi grave, et qui avoit eût des suites aussi terribles,
lors que tout à coup j'ai été éveillé pendant la nuit du dix
du mois de juin et invité à me transporter toute nuit
chez la malade, qui étoit tombée en foiblesse, sur les six
heures du soir et que l'on avoit morte par l'irregularité de son pouls
par la petite et son intermittence. cet état de crise pour la malade et
l'alarme pour tous ceux l'environnoit d'ava plus de deux heures



j'arrivai à peu près à trois heures du matin, on me raconta
ce qui s'étoit passé d'effrayant, et la malade depuis le matin avoit repris
de la force, et de la régularité me dit qu'elle se sentoit mal à l'estomac.
je crus qu'elle avoit mangé, mais je me trompois, c'étoit des vents
qui la tourmentoit d'ailleurs elle s'inquiétoit de devoir si longtemps
au lit sans pouvoir vaquer à ses affaires domestiques. ce qui me,
rassura beaucoup et sur la crainte que j'avois eue qu'elle n'eût mangé
et sur l'état de l'insurrection. je pensai à l'honneur ordinaire et comme
à l'accoutumé, il ne se trouva rien au pissement de contraire à la
parfaite cicatrice. je lui dis que l'inquiétude lui seroit tout à fait
l'opposé de l'assurance à la guérison, que l'état où elle se trouvoit,
demandoit de la patience, du repos, et de la fermeté, qu'elle étoit
hors de dangers, ce qui la rassura, la plaie n'étoit plus rien
j'y mettois seulement un peu de charpie rapée la diète fut continuée
on ajouta à son régime tous les matins un demi lavement fait avec
une decoction de feuille de mauve et quatre grains de camphre dissout
dans suffisante quantité d'huile d'olive. j'ai été obligé de passer
deux fois légèrement la pierre infernale sur la petite plaie, pour
corriger les chairs qui se passaient les bords. par ces moyens, le
régime, et ce traitement je suis arrivé au port et enfin terminé
heureusement une maladie aussi effrayante qu'elle étoit dangereuse
et qu'elle avoit donné l'alarme, la cicatrice a été parfaite et
bien consolidée le trente de mois de juin quarante jours après.

Opération.

Le succès de cette opération ne prouve-t-il pas l'innocuité
des suture dans la plus part des plaies de l'insurrection? et que
la nature seule du moins aidée d'un traitement méthodique
et bien entendu est capable de les conduire à une parfaite
réunion.

Confiance en moi-même de
chirurgien de 3 lieux au moins.

Vermillet

Observation sur la hernie avec
étranglement

Le nommé Antoine Bluchot âgé de 32 ans laboureur
à Montigni les Dames, portoit depuis 30 ans une hernie
complète à l'aîne droite, et qui venoit à sa volonté
mais le 20 juin 1798. dès le matin il éprouva des
accidens qui me firent soupçonner un étranglement herniaire
malgré les secours de l'art les mieux administrés, ces
accidens ont persistés d'une manière à me faire décider
le lendemain pour l'opération qui a été fructueuse.

Après avoir fixé mon malade convenablement, j'ouvris
la peau et la graisse, je disséchai le tissu cellulaire
j'ouvris le sac de la hernie, et il sortit par cette ouverture
une grande quantité d'eau rosâtre et puante par cette ouverture
dans laquelle l'intestin nageoit, j'en le trouvais poché adhérent
mais il étoit d'une couleur brune et sentoit mauvais. je le
redressai et ensuite j'appliquai l'appareil convenable. Dans ces
fortes de maladies, et les accidens cessent, j'en le levai quatre
jours après l'opération.

Je trouvais la plaie fort belle, et la suppuration étoit établie,
et de bonne qualité, je la pansai pendant huit jours comme
une plaie simple, avec un onguent de baillieau et de baume
d'arcanes à parties égales, et onfitte avec de la charpie sèche,
dans les premiers pansements, je faisois prendre au malade
quelques verres de decoction de quinquina de deux en
deux heures dans la matinée, et dans la journée diaphénie
lavement. Il sortit par les selles dans la suite des pansements
quelques petites portions de la tunique interne de l'intestin qui
paroissoient être semblable à celles que l'on vend dans les
entrevues d'une dysenterie putride. La suite a été des
plus saine le malade ne prenoit que de l'eau, comme de



de pain, lait de poule, lait d'amande de quatre en quatre
heures à l'alternative, avec le régime et mes soins
j'ay guéris parfaitement en trente six jours un
malade qui auroit péri ou du moins qui auroit bien
eu des accidens graves à surmonter, si j'avois
différé plus longtemps une opération indispensable,
ce qui fut faite sans accidens... et en peu de temps.

Veuillez m'envoyer